

Les espèces de poissons du Réservoir Baskatong

| Espèces | Familles | Limite de prise | Limite de taille | Longueur moyenne | Poids moyen | Période de reproduction | Nombre d'œufs | Maturité sexuelle | Longévité (ans) |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Doré jaune | Percidés | 6 | 37cm à 53cm | 107 cm | 11,3 kg | avril-mai(sud) à juillet (nord) | 23 000 à 612 000 | 2 à 6 | 29 |
| Doré noir | Percidés | | | 76 cm | 4 kg | mi-mai (sud) à mi-juin (nord) | 4 200 à 155 000 | 3 à 5 | 7 à 13 |
| Grand brochet | Ésocidés | 6 | | 150 cm | 35 kg | avril à début mai | 7 700 à 595 000 | 2 à 4 (sud) 5 à 6 (nord) | 30 |
| Touladi | Salmonidés | 2 | Minimum de 55cm | 150 cm | 46,3 kg | septembre à novembre | 697 à 18 000 | 4 à 17 | 50 |
| Ouananiche | Salmonidés | 3 | | 150 cm | 16,1 kg | octobre à décembre | 632 à 16 585 | 1 à 5 | 14 |
| Achigan à petite bouche | Centrarchidés | 6 | | 69 cm | 5,4 kg | fin mai à début juillet | 2 000 à 20 850 | 3 à 6 | 13 à 26 |
| Esturgeon jaune | Acipenséridés | 1 | | 274 cm | 141 kg | mai et juin | 50 000 à 886 000 | mâle 18 à 20, femelle 20 à 28 | 97 à 154 |
| Omble de fontaine | Salmonidés | 10 | | 86 cm | 9,4 kg | septembre à décembre | 18 à 17 000 | 1 à 3 | 4 à 15 |
| Lotte | Lotidés | | | 152 cm | 34 kg | janvier à mars | 45 600 à 1 363 000 | 3 à 4 | 20 |
| Perchaude | Percidés | 50 | | 50 cm | 1,9 kg | mi-avril à mai | 3 035 à 158 000 | 3 à 4 | 11 |
| Grand corégone | Salmonidés | 5 | | 100 cm | 19 kg | septembre à décembre | 6 000 à 150 000 | 3 à 7 mâle, 3 à 10 femelle | 17 à 50 |
| Barbotte brune | Ictaluridés | | | 55 cm | 2,9 kg | mai et juin | 2 000 à 13 800 | 3 | 5 à 12 |
| Crapet soleil | Centrarchidés | | | 40 cm | 0,6 kg | juin et juillet | 600 à 5 000 | 2 | 10 |
| Cisco de lac | Salmonidés | | | 59,7 cm | 3,4 kg | septembre à décembre | 3 800 à 49 000 | 3 à 6 | 13 |
| Chevalier rouge | Catostomidés | | | 75 cm | 5,8 kg | mai à mi-juillet | 13 500 à 29 750 | 3 à 5 | 14 |
| Quitouche | Cyprinidés | | | 51 cm | 1,6 kg | mai et juin | 2 000 à 12 000 | 3 à 5 | 9 |
| Meunier noir | Catostomidés | | | 65 cm | 3,2 kg | début mai à début juin | 775 à 140 000 | 3 à 9 | 15 |
| Meunier rouge | Catostomidés | | | 64,3 cm | 3,3 kg | mi-avril à mi-mai | 10 n300 à 60 300 | 4 à 10 | 24 |
| Omisco | Percopsidés | | | 20 cm | 8 g | mai | 126 à 1 350 | 1 à 2 | 4 |
| Chabot visqueux | Cottidés | | | 12,1 cm | ? | mai | 84 à 1 400 | 3 | 7 |
| Chabot tacheté | Cottidés | | | 15 cm | 6 g | mai | 56 à 950 | 2 à 3 | 4 |
| Chabot à tête plate | Cottidés | | | 13,4 cm | ? | août à octobre | ? | ? | ? |
| Épinoche à trois épines | Gastérostéidés | | | 11 cm | ? | juin et juillet | 100 à 350 | 1 | 4 |
| Épinoche à cinq épines | Gastérostéidés | | | 8,7 cm | 2 | fin avril à juillet | 250 (sur 1 seule ponte) | 1 | 3 |
| Épinoche à neuf épines | Gastérostéidés | | | 9 cm | ? | juin et juillet | 32 à 174 | 1 à 2 | 5 |
| Mulet perlé | Cyprinidés | | | 16 cm | ? | mai à mi-juillet | 500 à 2 150 | 2 | 3 à 10 |

| Espèces | Familles | Limite de prise | Limite de taille | Longueur moyenne | Poids moyen | Période de reproduction | Nombre d'œufs | Maturité sexuelle | Longévité (ans) |
|-------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Raseux-de-terre-gris | Percidés | | | 11 cm | 3 g | mai et juin | 54 à 668 | 2 | 4 |
| Fouille-roche zébré | Percidés | | | 18 cm | 8,5 g | mai et juin | 1 060 à 3 085 | 2 | 4 |
| Umbre de vase | Umbridés | | | 14 cm | 11 g | avril | 189 à 2 286 | 1 à 3 | 4 à 9 |
| Éperlan arc-en-ciel | Osméridés | | | 35,6 cm | 132 g | mars à mai | 1 700 à 69 600 | 2 à 3 | 6 |
| Méné jaune | Cyprinidés | | | 30 cm | 136 g | mai à août | 2 680 à 200 000 | 2 à 3 | 5 à 9 |
| Méné émeraude | Cyprinidés | | | 13 cm | ? | mi-mai à août | 888 à 5 443 | 2 | 4 |
| Mulet de lac | Cyprinidés | | | 23 cm | 33 g | fin avril à juin | 214 à 2 500 | 3 à 4 | 5 à 10 |
| Fondule barré | Fundulidés | | | 13 cm | 31 g | mai et juin | 200 à 252 | 1 à 2 | 3 |
| Méné à nageoires rouges | Cyprinidés | | | 20,1 cm | 35 g | mai à juillet | 900 à 1 150 | 2 | 5 |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

